

Saszetki

1. Opis, skład i stosowanie Femannose[®] N

1.1 Mechanizm działania

Zapalenie pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz choroby pokrewne to dolegliwości o podłożu mikrobiologicznym, które dotyczą przede wszystkim pęcherza moczowego i cewki moczowej.

W większości przypadków są one skutkiem wniknięcia niepatogennych bakterii z mikroflory dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Bakterie te mogą wykorzystywać napotkane warunki i przyczepiać się do ściany pęcherza moczowego oraz dróg moczowych, a następnie namnażać się. Sytuację taką obserwujemy najczęściej u młodych kobiet, podczas ciąży, jak również w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie; czasami występuje także u starszych mężczyzn albo u pacjentów cewnikowanych. W przypadku zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*), leczeniem pierwszego wyboru jest obecnie podawanie antybiotyków. Zdarzają się jednak bakterie odporne na leki, co może prowadzić do nawrotu zakażenia.

Femannose[®] N jest wyrobem medycznym wskazanym w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego (ZUM). D-mannoza może łagodzić najczęściej występujące objawy infekcji dolnych dróg moczowych (np. pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz moczowy itd.), w przypadku gdy przyczyną zakażenia jest bakteria *Escherichia coli*.

D-mannoza jest epimerem glukozy, który skutecznie zapobiega przyleganiu patogenów do nabłonka dróg moczowych. Co za tym idzie – może powstrzymywać przywieranie mikroorganizmów, które już wniknęły do układu moczowo-płciowego. Dzięki temu następuje zmniejszenie wirulencji lub też przyczepialności do tkanki dróg moczowych, co pomaga w sposób „mechaniczny” zapobiegać nawrotom zakażenia.

Femannose[®] N, stosowany w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego, może – wraz z antybiotykami – działać synergistycznie, ponieważ działanie przeciwdrobnoustrojowe tych środków jest odmienne i nie pokrywa się wzajemnie. Przede wszystkim dzięki swoim składnikom Femannose[®] N nie przyczynia się do powstawania lekooporności.

1.2 Skład

Każda saszetka zawiera:

2 g D-mannozy

Substancje pomocnicze: substancje słodzące: fruktoza, sukraloza; kwas cytrynowy; barwnik: korzeń buraka; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; aromat.

2. Opakowanie

Opakowanie zawiera 14 saszetek po 4g.

3. Dawkowanie i wskazówki dotyczące stosowania:

Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 14 lat.

W leczeniu wspomagającym ostrego zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) zaleca się następujące dawkowanie:

Dzień	Liczba saszetek dziennie
Od 1. do 3. dnia	3
4. i 5. dzień	2

Przyjmowanie pojedynczych saszetek należy rozdzielić w ciągu dnia.

Zalecana dawka w profilaktyce zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) to 1 (jedna) saszetka dziennie.

Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody. Zaleca się picie co najmniej dwóch litrów wody dziennie, aby zwiększyć ilość oddawanego moczu. Aby zapobiec nawrotowi infekcji, należy kontynuować stosowanie przez jeden miesiąc.

4. Działania niepożądane

Specjalne testy wykazały, że składniki Femannose[®] N są bezpieczne, w pełni biokompatybilne oraz dobrze tolerowane. W przypadku dawkowania wymaganego do leczenia wspomagającego nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, z wyjątkiem indywidualnej nietolerancji, która może być przyczyną nudności, wzdęć i luźnego stolca. Jeśli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem.

5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Nie są znane interakcje składników Femannose[®] N z suplementami diety. Jednakże suplementy diety, włączając w to witaminy, składniki odżywcze, jak również ziołowe i homeopatyczne produkty lecznicze, powinny być przyjmowane co najmniej dwie godziny przed lub po zastosowaniu Femannose[®] N. Interakcje z innymi lekami: jednoczesne przyjmowanie Femannose[®] N nie wpływa na skuteczność antybiotyków. Działanie antyadhezyjne Femannose[®] N nie powoduje lekooporności.

D-mannoza nie jest metabolizowana i dlatego nie wchodzi w interakcje z innymi substancjami.

6. Przechowywanie

Przechowywać Femannose[®] N w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła i światła. Saszetkę należy otworzyć tuż przed użyciem. Przechowywać produkt w temperaturze poniżej 25 °C.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Femannose® N należy stosować tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Femannose® N nie zastępuje antybiotykoterapii zakażeń układu moczowego. Nie należy stosować Femannose® N w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek ze składników.

W okresie ciąży i karmienia piersią zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Produktu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat.

Zalecana dawka nie może zostać przekroczona!

Jeżeli po upływie trzech dni nie nastąpiła wyraźna poprawa, należy przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy przyjmować Femannose® N dłużej niż 30 dni. Jeśli objawy się utrzymują, skonsultuj się z lekarzem. Każda saszetka przeznaczona jest do jednorazowego zastosowania i należy ją otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

8. Termin ważności

Nie należy przyjmować produktu po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

9. Utylizacja

Produkty, których data ważności upłynęła, muszą być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Nie wolno wyrzucać produktu i jego opakowania do środowiska naturalnego.

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2019

Twoja opinia jest dla nas ważna. Przejście przez kwestionariusz nie zajmie dłużej niż 5 minut. Zeskanuj proszę kod QR, lub wejdź w podany link, w celu oceny naszego produktu.

<https://www.siiit-pms.com/femannose-N-PL>



 ^{25°C} Warunki przechowywania



 Wyrób medyczny
0426



S.I.I.T. srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
WŁOCHY

Dystrybutor

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Firma Klosterfrau Healthcare Group